

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

***** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?*****

***** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?*****

A nivel mundial se ha descrito la ventaja de la vacuna contra rotavirus en la disminución de complicaciones y hospitalizaciones cuando se aplica en menores de 6 meses.

En El Salvador durante los últimos 3 años se han presentado brotes Diarreas en menores de 5 años asociados a rotavirus, especialmente en los menores de 1 año

El Salvador junto a Panamá sale adelante con la introducción de esta vacuna en el Esquema Nacional Con una inversión de \$ 2 millones incluyendo costos del biológico, jeringas, capacitación y campaña de Divulgación.



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

***** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?*****

***** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?*****

Los rotavirus son la causa más común de gastroenteritis severa con deshidratación en los niños de 0 a 5 años de edad, tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo.

Una revisión bibliográfica sobre rotavirus, efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluye que a nivel mundial los rotavirus son los agentes causales del 20-70% del total de hospitalizaciones por diarrea, así como del 20% de todas las muertes por diarrea ocurridas en los niños menores de 5 años , ésto en números absolutos significa alrededor de 500,000 muertes al año.

El 85% de estas ocurre en el tercer mundo.



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

*** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?***

*** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?***

¿Qué es un rota virus?

La causa más común de diarrea grave en los bebés y niños pequeños es el rota virus. Casi todos los niños sufren infección con rota virus por lo menos una vez antes de cumplir los 3 años de edad. Sin embargo la repetición de la infección es común y niños mayores y adultos pueden contagiarse también. En los adultos, la mayoría de las infecciones no causan ningún síntoma, aunque la infección puede seguir contagiando a otras personas. En Minnesota la infección por rota virus es más común durante los meses de invierno.



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

***** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?*****

***** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?*****

¿Cómo contrajo la infección mi niño?

El rota virus es muy contagioso. El virus se encuentra en grandes cantidades en las heces (materia fecal) de las personas infectadas. Se contagia tocando a personas que lo tienen o tocando objetos que han estado en contacto con las heces y después llevándose la mano a la boca. Esta clase de contagio infeccioso se conoce como “transmisión copro-oral.”

Debido a que el rota virus es muy contagioso se están estudiando otros medios de contagio posibles.

En las personas saludables, el virus se ha encontrado en las heces hasta 10 días después del inicio de la enfermedad. En individuos con el sistema inmunológico debilitado la infección puede durar más tiempo.



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

***** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?*****

***** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?*****

¿Cuáles son los síntomas de Rota virus?

Los niños pueden tener fiebre y vómitos antes de la aparición repentina de diarrea acuosa y severa.

¿Qué puedo hacer por mi niño?

No hay una medicina o tratamiento específico para el rota virus. Trátelo como usted lo haría en el caso de vómito y diarrea (mire el folleto informativo sobre “Vómito” y “Diarrea”). No administre medicinas de venta al público sin consultar antes a su doctor.

Los niños que usan pañales necesitarán Cuidados adicionales para proteger la piel del sarpullido de pañal debido a las frecuentes deposiciones intestinales. Siga las indicaciones del folleto informativo “Sarpullido del pañal.”

Si un niño se deshidrata puede ser necesaria la admisión al hospital para suministrar líquidos Intravenosos (IV).



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

*** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?***

*** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?***

¿Cuándo debo llamar al doctor?

Llame si el niño tiene algún síntoma de Deshidratación (mire el folleto informativo “Diarrea”).



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

*** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?***

*** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?***

¿Qué más necesito saber?

Para prevenir que la infección del rota virus se

Contagie lo más importante es **lavarse bien las manos** con jabón; por lo menos por 15 segundos, o usar desinfectante de manos con alcohol como Purell®.

Es muy importante lavarse las manos después de cambiar los pañales o usar el baño y antes de tocar o comer alimentos. También puede ayudar el lavar con agua y jabón los juguetes y las superficies de la casa, si han sido contaminadas con heces.



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

DIARREA

***** ¿Cuáles son los objetivos de este curso?*** ¿ A quien esta dirigido el curso?*****

***** ¿Qué esperamos de usted?*** ¿Cuál es la metodología del curso?*****

En el hospital la mayoría de los niños con Rota virus tendrán un IV (un catéter Intravenoso) para administrarle líquidos hasta que pueda beber y comer bien. Los niños con rota virus necesitan permanecer en su habitación para prevenir el contagio de la infección a otros. Puede que compartan la habitación con otro niño con rotovirus. El personal del hospital usará guantes y batas. Como es un virus, los antibióticos no le sirven de ayuda.

Los niños con rota virus pueden volver a sus actividades de grupo, incluyendo la guardería, cuando la fiebre y el vómito han desaparecido, las heces ya no son acuosas o se salen de los pañales y el niño está comportándose como de costumbre.



**Pan American
Health
Organization**



Regional Office of the
World Health Organization